

[Protocol No. AKP-005]

ホルモン不応性前立腺癌に対する

Docetaxel+Prednisolone+Zoledronic Acid 療法

Docetaxel	70mg/m ²	day 1	div.
Prednisolone	10mg (2錠)/day	連日朝・夕	p. o.
Zoledronic Acid	4mg	day1	div.

☞ <docetaxel 前投与> デキサメサゾン 8mg, ナゼア 0.3mg 投与前 div
☞ Zoledronic Acid は骨転移症例のみ

投与量減量 (-1)

Docetaxel	60mg/m ²	day 1	div.
Prednisolone	10mg (2錠)/day	連日朝・夕	p. o.
Zoledronic Acid	4mg	day1	div.

投与量減量 (-2)

Docetaxel	50mg/m ²	day 1	div.
Prednisolone	10mg (2錠)/day	連日朝・夕	p. o.
Zoledronic Acid	4mg	day1	div.

参考文献

- Docetaxel plus prednisone or mitoxantrone plus prednisone for advanced prostate cancer, Tannock IF, N Eng J med, 2004
- Zoledronic acid increases docetaxel cytotoxicity through pMEK and Mcl-1 inhibition in a hormone-sensitive prostate carcinoma cell line. Fabbri F, J Transl Med, 2008

[Protocol No. AKP-005]

病院 泌尿器科 病棟

Docetaxe+Prednisolone+Zoledronic Acid 療法 コース目

(28 日スケジュール)

名前:	様	歳	性別:	男	
ID:	生年月日:	昭和	年	月	日
身長:	cm、	体重	kg、	体表面積:	m ²

薬品 1: ドセタキセル (商品名: タキソテール)

剤型: 20mg/瓶、80mg/瓶

用法: 1日1回、3時間で点滴静注。

投与方法: 生理食塩水 500ml で溶解。

(投与量: 70 mg × m² =
mg)

1日1回	
1回投与量	mg

薬品 2: プレドニゾロン (商品名: プレドニゾロン)

剤型: 5mg 錠 一日 10mg

用法: 1日2回、毎日、朝夕。

薬品 3: ゾレドロン酸 (商品名: ゾメタ)

剤型: 4mg

用法: 1日1回、15分以上かけて点滴静注。

投与方法: ブドウ糖注射液 (5%) 100mL に希釈。

投与日	Day1	Day2-28
ドセタキセル (商品名: タキソテール)	mg	
プレドニゾロン (商品名: プレドニゾロン)	10 mg	10 mg
ゾレドロン酸 (商品名: ゾメタ)	4 mg	

Docetaxel+Prednisolone+Zoledronic Acid 療法

_____コース目（28日スケジュール）

患者名：_____

主治医：_____

本プロトコールの

開始予定日：_____年_____月_____日

完了予定日：_____年_____月_____日

承認日：_____年_____月_____日

確認医師署名：_____

確認医師署名：_____

本人署名：_____

代諾人署名：_____