

[Protocol No. AKT-001]

## 転移浸潤性尿路上皮癌に対する GCD 療法 (21-day cycle)

適応条件 : M-VAC 不応例、不適合例、腎機能不良例 (Ccr < 40 ml/min)

Gemcitabine	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8	div.
Docetaxel	70 mg/m <sup>2</sup>	day 1	div.
Carboplatin	AUC 5	day 1	div.

☞ <docetaxel 前投与> デキサメサゾン 8mg/day 前日, 初日 p. o. で投与。  
☞ <Carboplatin 投与量>  
投与 Dose=AUC × [ {(140-age) × BW(kg) / (72 × SCr)} + 25 ] (女性は × 0.85)  
♪ 投与コース上限なし。最大 14 コース経験あり。コース毎に C T で効果判定。

### 投与量減量 (-1)

Gemcitabine	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8	div.
Docetaxel	60 mg/m <sup>2</sup>	day 1	div.
Carboplatin	AUC 4	day 1	div.

### 投与量減量 (-2)

Gemcitabine	1000 mg/m <sup>2</sup>	day 1, 8	div.
Docetaxel	50 mg/m <sup>2</sup>	day 1	div.
Carboplatin	AUC 3	day 1	div.

