

GA 療法          コース目 (14 日スケジュール)

名前：	様	歳	性別：	男	女
ID：	生年月日：大正   昭和   平成		年	月	日
身長：	cm、	体重	kg、	体表面積：	m <sup>2</sup>

薬品 1：ゲムシタビン (商品名：ジェムザール)

剤型：1g/瓶

用法：1日1回、30分で点滴静注。

投与法：生理食塩水 200ml で溶解。

(投与量：1500mg ×          m<sup>2</sup> =          mg )

1日1回	
1回投与量	mg

薬品 2：アドリアマイシン (商品名：アドリアシン)

剤型：10mg/瓶

用法：1日1回、3時間で点滴静注。

投与法：5%ブドウ糖 250ml で溶解。

(投与量：50mg ×          m<sup>2</sup> =          mg )

1日1回	
1回投与量	mg

投与日	day1   /
ゲムシタビン (商品名：ジェムザール)	mg
アドリアマイシン (商品名：アドリアシン)	mg

**参考文献 : Nanus DM et al. Cancer 101, 1545-1551, 2004**

<原法 : 14-day cycle, phase II study for sarcomatoid or rapidly progressing RCC>

(投与量)

Doxorubicin 50 mg/m<sup>2</sup>, i.v. day 1, bolus infusion

Gemcitabine 1500 - 2000mg/m<sup>2</sup>, i.v. day 1, over 1 hour

GCSF 5μg/kg, s.c. day 3-11 or until WBC > 10,000

<効果> n=18, 奏効率 39%, CR 11%, PR 28%