

ま す い

お子さんへの麻酔のながれ

しゅじゅつ まえ た の  
手術の前は、食べたり飲んだりできません。



た の い なか のこ じょうたい ますい  
食べたり飲んだりしたものが、胃の中に残っている状態で麻酔をかけると  
い なか ぎゃくりゅう はい なが おも はいえん お  
胃の中のものが逆流して肺に流れこみ、重い肺炎を起こすことがあります。  
かなら せいげん  
必ず制限をまもってください。

あす ぶん だ の  
明日の分のおくすりは、出されたものだけ飲んでください。




しゅじゅつ さい けつあつ さ ち と  
手術に際して血圧が下がったり、血が止まりにくくなるおくすりがあります。  
わたし かんじゃ の  
私たちは、患者さんがどんなおくすりを飲んでいるかわかっていますので、  
しんぱい  
心配しないでください。

ほごしゃ しゅじゅつしつ なか いっしょ はい  
保護者も手術室の中まで一緒に入っていただけます。



びょうとう こ きんちよう つか  
病棟でお子さんの緊張をとるためのくすりを使うときもあります。

しゅじゅつしつ はい しんでんず けつあつけい  
手術室に入ったら、心電図や血圧計などのモニターをつけて  
てんてき  
点滴をとります。（点滴は、入室前に病室でとることもあります）



かお

しんこきゅう

かえ

顔にマスクをあてますので、深呼吸をくり返してください。

さんそ す

じゅうぶんに酸素を吸っていただきます。



てんてき

くすり

とうよ

ねむ

点滴から薬が投与されて、いつのまにか眠ってしまいます。



こ                      ね                      てんてき  
お子さんが寝てしまってから点滴をとります。  
かんぜん    ねむ                      いた                      かん  
完全に眠ってからとるので痛みは感じません。



こ                      ね                      ほごしゃ    かた                      たいしつ  
お子さんが寝てしまったら保護者の方には退室していただきます。  
しゅじゅつしゅりょう    びょうとう                      ま  
手術終了まで病棟でお待ちください。



こきゅう たす くち はな のど おく きかん  
呼吸を助けるチューブを口（または鼻）から喉の奥の気管  
い かんぜん ねむ いた かん  
に入れます。完全に眠ってから入れるので痛みは感じません。



チューブの代わりに、やわらかいマスクを入れることもあります。

しゅじゅつご いた と のぞ まっしょうしんけい

# 手術後の痛みを取り除くために末梢神経ブロックを

おこな

行うこともあります。

しゅじゅつ ばしょ  
手術する場所によって  
した また つ ね  
わきの下, 股の付け根,  
ひざ うらがわ おこな  
膝の裏側などに行います



ふくぶ せなか おこな

腹部や背中に行うこともあります。

かんぜん ねむ

おこな

いた

かん

**完全に眠ってから行うので痛みは感じません。**



しゅじゅつちゆう　　ますい　　かんぜん　　ねむ

いた　　かん

**手術中は麻酔で完全に眠っているため、痛みは感じません。**

ますい　　かい　　かなら

麻酔科医が必ず

そばにいて患者さん

に<sup>へんか</sup>変化がないか

<sup>みまも</sup>見守っています



しゅじゅつ お きかん はい め  
手術が終わったら、気管に入っていたチューブを抜きます。




ますい さ びょうしつ もど  
麻酔から醒めたら病室に戻ります。

ちよくご さ おぼ  
(直後はぼんやりしていて、醒めたときのことを覚えていないこともあります)




しゅじゅつご                      さんそ      とうよ  
**手術後，しばらく酸素を投与します。**



かくせいじこうふん                      しゅじゅつご                      あば  
**覚醒時興奮といって，手術後すぐに暴れたりすることがあります。**

しんぞうしゅじゅつ                      しゅじゅつご                      い  
心臓手術などでは、手術後しばらくチューブを入れたまま  
じんこうこきゅう    けいぞく  
で人工呼吸を継続することがあります。



ねむ                      つか                      くる                      おも  
眠るためのくすりを使いますので、苦しい思いはしません。  
ぜんしんじょうたい    あんてい                      ぬ                      じんこうこきゅう    しゅうりょう  
全身状態が安定してくれば、チューブを抜いて人工呼吸を終了します。



い は きず かのうせい  
チューブを入れることで歯を傷つける可能性があります。  
は い ば さ ば かた ますい かい  
グラグラしている歯, 入れ歯, 差し歯がある方は麻酔科医に  
し  
お知らせください。



くち ひら かた あご いた かた くび うご かた  
口が開きにくい方, 顎に痛みがある方, 首が動かしにくい方,  
くび しゅじゅつ う かた ますい かい し  
首の手術を受けたことがある方も麻酔科医にお知らせください。