

9) GIST

症例数 ; 2 症例 (男 : 女 = 1 : 1)

年齢 ; 47-59 歳 (中央値 53 歳)

原発巣 ;

腸間膜	2

転移巣 ;

転移巣	0
-----	---

前治療 ;

前治療	
手術	1
化学療法	0

治療スタイル ;

術前補助療法	0
術後補助療法	1 (Ima)
切除不能・再発	1
未治療	0

Ima; Imatinib

併用治療 ;

併用治療	0
------	---

全生存期間 ; (発症日から)

未到達

有害事象 ; グレード 4 以上

Regimen	Neu	Hb	Plt	Liver Dys	Renal Dys
Ima	0	0	0	0	0

10) Soft Tissue Sarcoma

症例数 ; 10 症例 (男 : 女 = 6 : 4)

年齢 ; 28-80 歳 (中央値 51 歳)

原発巣 ;

頭頸部	2
胸部	3
腹部	3
骨盤	2

転移巣 ;

転移巣	
リンパ節	4
肝	1
肺	3
骨	3

前治療 ;

前治療	
手術	9
化学療法	3
放射線	3

治療スタイル；

術前補助療法	0
術後補助療法	0
切除不能・再発	6
放射線	2
未治療	2

全生存期間；(初診日から)

17日(確定分、1症例)

有害事象；グレード4以上

Regimen	Neu	Hb	Plt	Liver Dys	Renal Dys
IFO	4	0	0	0	0
GEM+DTX	1	0	0	0	0
VBL+MTX	1	0	0	0	0