

5) 膵臓がん

症例数 ; 7 症例 (男 : 女 = 6 : 1)

年齢 ; 64- 85 歳 (中央値 76.5 歳)

組織型 ;

| 組織型 (AC) | |
|--------------|---|
| well | 0 |
| moderate | 1 |
| por | 0 |
| unclassified | 0 |
| unknown | 6 |

転移巣 ;

| 転移巣 | |
|------|---|
| 肺 | 0 |
| 肝 | 4 |
| リンパ節 | 2 |
| 骨 | 0 |
| 腹膜 | 1 |
| 胸膜 | 0 |
| その他 | 0 |

前治療 ;

| | |
|------|---|
| 前治療 | |
| 手術 | 1 |
| 化学療法 | 2 |

治療スタイル ;

| | |
|-----------|------|
| 術後補助療法 | 0 |
| 進行再発がん | 下図参照 |
| BSC | 1 |
| コンサルテーション | 1 |

併用治療 ;

| | |
|-------|---|
| 併用治療 | |
| 手術 | 0 |
| 放射線治療 | 1 |

進行再発がんに対する化学療法のレジメン ;

| Regimen | 1 st | 2 nd | 3 rd |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GEM | 4 | 0 | 0 |
| S1 | 0 | 3 | 0 |
| GEM+S1 | 1 | 0 | 0 |
| GEM+erlotinib | 0 | 1 | 0 |
| GEM+Curcumin | 0 | 0 | 2 |

進行再発がんに対する化学療法の治療成績 ; Time to Progression (Days)

| Regimen | 1 st | 2 nd | 3 rd |
|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
| GEM | 92-244 (186) | NE | NE |
| S1 | NE | 7-146 (72) | NE |
| GEM+Cur | NE | NE | 28-106 (67) |

進行再発がんに対する化学療法の治療成績； Best Response*

| Regimen | Over all | Disease Static Rate* |
|---------|----------|----------------------|
| GEM | 2SD, 1PD | 66.6 % |
| S1 | 1SD, 2PD | 33.3 % |
| GEM+Cur | 2PD | 0 % |

*RECIST とは異なる独自の指標（効果持続期間を問わない）。

全生存期間；（初診日から）

83-415 日（中央値；221.5 日）（確定分、6 症例）

有害事象；グレード 3/4 以上

| Regimen | T | a | AST/ALT | n | FN |
|---------|---|---|---------|---|----|
| GEM | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| S1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| GEM+Cur | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

T: Thrombocytopenia, a: anemia, n: neutropenia