

レジメン名	大腸癌 IRIS 療法				
適応病名	大腸癌				
1 クールの日数	21 日	実施場所	外来・病棟		
投与薬剤名					
番号	抗癌剤名・略号	1 回投与量	投与法	投与回数	投与日
1	イリノテカン	150 mg / m ²	点滴静注	1 回/日	Day 1
2	S-1 (テガフル・ギメラシル・オテラシルカリウム)	40 mg / m ²	経口	2 回/日	Day1-14
臨床使用分類	治療：エビデンスレベル 4				
ガイドライン 文献名	Phase I / II study of sequential therapy with irinotecan and S-1 for metastatic colorectal cancer. Br J Cancer 101：1972 - 77, 2009.				
その他	Day1 から Day14 まで S-1 を以下の用量で 1 日 2 回、14 日間連日経口投与。 体表面積 1.25 m ² 未満、1 回用量 40 mg 体表面積 1.25 m ² 以上 - 1.5 m ² 未満、1 回用量 50 mg 体表面積 1.5 m ² 以上、1 回用量 60 mg				

投与スケジュール

投与日	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	備考
			(ルート等)		
Day 1	① 生食 50 mL + アザセトロン塩酸塩注 10 mg + デキサメタゾン 9.9 mg		点滴注射	15 分	
	② イリノテカン	150 mg / m ²	点滴注射	90 分	生理食塩液 500 mL で希釈
Day 1-14	S-1	40 mg / m ² / 回	経口投与	1 日 2 回	Day1 タより開始