

レジメン名	大腸癌 XELOX 療法				
適応病名	大腸癌				
1 クールの日数	21 日	実施場所	外来・病棟		
投与薬剤名					
番号	抗癌剤名・略号	1 回投与量	投与法	投与回数	投与日
1	オキサリプラチン	130 mg / m ²	点滴静注	1 回/日	Day 1
2	カペシタビン	1000 mg / m ²	経口	2 回/日	Day1-14
臨床使用分類	治療：エビデンスレベル 2				
ガイドライン 文献名	Randomized Phase III Study of Capecitabine Plus Oxaliplatin Compared With Fluorouracil/Folinic Acid Plus Oxaliplatin As First-Line Therapy for Metastatic Colorectal Cancer. J Clin Oncol 26：2006 - 201, 2008.				
その他	Day1 から Day14 までカペシタビンを以下の用量で 1 日 2 回、14 日間連日経口投与。 体表面積 1.36 m ² 未満、1 回用量 1,200 mg 体表面積 1.36 m ² 以上 - 1.66 m ² 未満、1 回用量 1,500 mg 体表面積 1.66 m ² 以上 - 1.96 m ² 未満、1 回用量 1,800 mg 体表面積 1.96 m ² 以上、1 回用量 2,100 mg				

投与スケジュール

投与日	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	備考
			(ルート等)		
Day 1	① 生食 50 mL + グラニセトロン塩酸塩注 3 mg + デキサメタゾン 9.9 mg		点滴注射	15 分	
	② オキサリプラチン	130 mg / m ²	点滴注射	120 分	5%ブドウ糖液 250 mL で希釈
Day 1-14	カペシタビン	1000 mg / m ² / 回	経口投与	1 日 2 回	Day1 タより開始