

レジメン名	呼内-アリムタ療法				
適応病名	非小細胞肺癌				
1クールの日数	21日	実施場所	外来・病棟		
投与薬剤名					
番号	抗癌剤名・略号	1回投与量	投与方法	投与回数	投与日
1	ペメトレキセド	500 mg / m <sup>2</sup>	点滴静注	1回/日	Day 1
臨床使用分類	治療：エビデンスレベル 2				
ガイドライン 文献名	Hanna N et al; Randomized phase III trial of pemetrexed versus docetaxel in patients with non-small-cell lung cancer previously treated with chemotherapy. J Clin Oncol 22(9) 1589 - 1597, 2004.				
その他	<ul style="list-style-type: none"> <li>・初回投与 7日前よりパンピタン® 1g (葉酸として 0.5g) を1日1回連日経口投与</li> <li>・初回投与の 7日前から投与期間中 9週ごとにビタミン B<sub>12</sub> 製剤を1回 1mg 筋肉内投与。 (葉酸、V.B<sub>12</sub> とともに最終投与日から 22日目まで投与)</li> </ul>				

### 投与スケジュール

投与日	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	備考
			(ルート等)		
Day 1	① 生食 50 mL + デキサメタゾン 6.6 mg		点滴注射	15分	
	② ペメトレキセド	500 mg / m <sup>2</sup>	点滴注射	10分	生理食塩液 100 mL で溶解・希釈