

| | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|-------|-------|---------|
| レジメン名 | 大腸癌 Bev+XELOX 療法 | | | | |
| 適応病名 | 大腸癌 | | | | |
| 1 クールの日数 | 21 日 | 実施場所 | 外来・病棟 | | |
| 投与薬剤名 | | | | | |
| 番号 | 抗癌剤名・略号 | 1 回投与量 | 投与方法 | 投与回数 | 投与日 |
| 1 | ベバシズマブ | 7.5 mg / kg | 点滴静注 | 1 回/日 | Day 1 |
| 2 | オキサリプラチン | 130 mg / m ² | 点滴静注 | 1 回/日 | Day 1 |
| 3 | カペシタビン | 1000 mg / m ² | 経口 | 2 回/日 | Day1-14 |
| 臨床使用分類 | 治療：エビデンスレベル 2 | | | | |
| ガイドライン 文献名 | Bevacizumab in combination with oxaliplatin-based chemotherapy as first-line therapy in metastatic colorectal cancer: a randomized phase III study. J Clin Oncol. 26 : 2013 - 2019, 2008. | | | | |
| その他 | Day1 から Day14 までカペシタビンを以下の用量で 1 日 2 回、14 日間連日経口投与。 体表面積 1.36 m ² 未満、1 回用量 1,200 mg 体表面積 1.36 m ² 以上 - 1.66 m ² 未満、1 回用量 1,500 mg 体表面積 1.66 m ² 以上 - 1.96 m ² 未満、1 回用量 1,800 mg 体表面積 1.96 m ² 以上、1 回用量 2,100 mg | | | | |

投与スケジュール

| 投与日 | 薬品名 | 投与量 | 投与経路 | 投与時間 | 備考 |
|----------|--|------------------------------|--------|---------|------------------------|
| | | | (ルート等) | | |
| Day 1 | ① 5 %ブドウ糖液 50 mL + アザセトロン塩酸 塩注 10 mg + デキサメタゾン 9.9 mg | | 点滴注射 | 30 分 | |
| | ② ベバシズマブ | 7.5 mg / kg | 点滴注射 | 90 分* | 生理食塩液で全量 100 mL に調製 |
| | ③ オキサリプラチン | 130 mg / m ² | 点滴注射 | 120 分 | 5%ブドウ糖液 250 mL で希釈 |
| Day 1-14 | カペシタビン | 1000 mg / m ² / 回 | 経口投与 | 1 日 2 回 | Day1 タより開始 |

※2 回目以降は忍容性に応じて 60 分→ 30 分と短縮可能