

レジメン名	胃癌 Trastuzumab+XP 療法				
適応病名	胃癌				
1 クールの日数	21 日	実施場所	病棟		
投与薬剤名					
番号	抗癌剤名・略号	1 回投与量	投与法	投与回数	投与日
1	トラスツズマブ	8 mg / kg (2 回目以降 6 mg / kg)	点滴静注	1 回/日	Day 1
2	シスプラチン	80 mg / m ²	点滴静注	1 回/日	Day 1
3	カペシタビン	1000 mg / m ²	経口	2 回/日	Day1-14
臨床使用分類	治療：エビデンスレベル 2				
ガイドライン 文献名	Trastuzumab in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled trial. Lancet. 376 : 687 - 697, 2010.				
その他	Day1 から Day14 までカペシタビンを以下の用量で 1 日 2 回、14 日間連日経口投与。 体表面積 1.36 m ² 未満、1 回用量 1,200 mg 体表面積 1.36 m ² 以上 - 1.66 m ² 未満、1 回用量 1,500 mg 体表面積 1.66 m ² 以上 - 1.96 m ² 未満、1 回用量 1,800 mg 体表面積 1.96 m ² 以上、1 回用量 2,100 mg				

投与スケジュール

投与日	薬品名	投与量	投与経路	投与時間	備考
			(ルート等)		
Day 1	① ラクテック注	500 mL	点滴注射	120 分	
	② ラクテック注	500 mL	点滴注射	120 分	
	③ ラクテック注	500 mL	点滴注射	120 分	
Day 2	① トラスツズマブ	8 mg / kg (2 回目以降 6 mg / kg)	点滴注射	30 分 ～ 90 分	初回は 90 分で投与。初回投与の忍容性が良好であれば、2 回目以降は 30 分間に短縮。
	② 生理食塩液	50 mL	点滴注射	5 分	
	③ 生食 100 mL + グラニセトロン塩酸塩 3 mg + デキサメタゾン 9.9 mg		点滴注射	30 分	
	④ シスプラチン	80 mg / m ² (生食で全量を 500 mL とする)	点滴注射	120 分	
	⑤ 20 % マンニトール	200 mL	点滴注射	60 分	
	⑥ ラクテック注	500 mL	点滴注射	120 分	
	⑦ ラクテック注	500 mL	点滴注射	120 分	
Day 1-14	カペシタピン	1000 mg / m ² / 回	経口投与	1 日 2 回	Day1 タより開始