


★GD療法★

(1週目)

- ①生理食塩液 100ml
カイトリル注射液 (3mg) 約 30 分
- ②生理食塩液 100ml
ジェムザール注射用____g 約 30 分
- ③ソルテム 3A 500ml 約 2 時間 30 分

(2週目)

- ①生理食塩液 100ml
ザンタック注射液 50mgZ. 5%
テカドロン注 (4mg) × 2A
カイトリル注射液 (3mg) 約 30 分
- ②5%ブドウ糖注 250ml
ドセタキセル注____mg 約 1 時間
- ③生理食塩液 100ml
ジェムザール注射用____g 約 30 分
- ④生理食塩液 100ml
カイトリル注射液 (3mg) 約 30 分
- ⑤ソルテム 3A 500ml 約 2 時間 30 分



2 週目
化学療法当日の
20 時から 2 日間
20 時、8 時に
テカドロン内服

ドセタキセル使用時、
重篤な過敏症予防のため
デカドロン内服！！

☆デカドロン内服方法☆



- ・薬袋に内服する日付、時間(**20時、8時**)を記入する。
- ・自己管理できる患者には、その日の受け持ち看護師が責任を持って渡す。
(点滴終了後同時に渡す)
- ・看護師管理の場合には、**赤い板**にはさんで保管し、その日の受け持ち看護師が内服時間に、患者へ手渡し内服を確認する。
- ・各勤務に申し送る。

注！意

☆GD療法の注意事項☆

特に**初回**と**2回目**は過敏症状(**呼吸困難感、** **血圧低下**など)に注意する。

☆点滴ルート準備・接続☆



★TC療法★

**血管確保後
即ベナ錠内服！**

①生理食塩液 100ml
デカドロン (4mg) ×5A
ゾフラン (4mg)
ザンタック注射液 50mg2.5% 約30分

②5%ブドウ糖注 500ml
パクリタキセル注射液____mg 約3時間

③生理食塩液 250ml
カルボフラチン注射液____mg 約1時間

④ソルテム 3A 500ml 約2時間30分

⑤生理食塩液 100ml
ゾフラン (4mg) 約30分

重度の過敏症を予防するために
パクリタキセル投与 **30分前**に
デカドロン、**ザンタック**投与、
ベナ錠内服！！

☆副作用☆

- ・骨髄抑制 10～14日
- ・嘔気 2～3日
- ・筋肉痛・関節痛 3～4日
- ・重度の過敏症
(1時間毎のバイタル測定)



パクリタキセルの前にカルボフラチン
を投与すると骨髄抑制が強くなる
可能性あり！！

- ・起床後
- ・抗ガン剤投与後
- ・抜針後 等

☆点滴ルートの準備・接続☆



パクリタキセルの結晶が析出する可能性
があるため結晶除去目的で0.22ミクロン以下
の**フィルター**を必ず通すこと！！

